

*STIKO empfiehlt Rotavirus
Standardimpfung von Säuglingen*

**Die Ständige Impfkommission (STIKO)
empfiehlt die allgemeine Rotavirus (RV)-
Schluckimpfung von Säuglingen.**

**Primäres Ziel der Empfehlung ist es,
schwere RV-Infektionen bei Säuglingen
und Kindern zu verhindern, die zu
Krankenhaus-Behandlungen führen.**

**Die Impfserie soll im Alter von 6 bis 12 Wochen begonnen
werden** und muss je nach Impfstoff **spätestens bis zur
vollendeten 24. bzw. 32. Lebenswoche** abgeschlossen sein. In
Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff sind **2 bzw. 3 orale
Impfstoffdosen notwendig**, die jeweils in einem 4-wöchigen
Mindestabstand verabreicht werden.

RV sind die häufigste Ursache von Gastroenteritiden (Magen-
Darm-Infektionen) bei Kindern unter 5 Jahren. Jährlich werden
etwa 20.000 Kinder in Deutschland aufgrund einer RV-Infektion
stationär zur Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution
aufgenommen, von denen ca. 50 intensivmedizinisch betreut
werden müssen.