



### 1 Einfachauswahl

Unter einer Verhaltenstherapie versteht man

- A eine klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie (nach Rogers)
- B eine psychoanalytische Psychotherapie
- C eine psychoanalytische Fokalthherapie
- D eine übertragungsfokussierende Psychotherapie
- E ein Behandlungsverfahren, das auf Erkenntnissen der empirischen Psychologie (z.B. Lerntheorie) basiert

### 2 Aussagenkombination

Welche Komplikationen bzw. Symptomen können bei einer Anorexia nervosa auftreten?

- 1 Abführmittelmissbrauch
- 2 Suizidalität
- 3 Natrium- und Kaliummangel
- 4 Selbstinduziertes Erbrechen
- 5 Deutliche Verminderung der Libido bei Männern

- A Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- B Nur die Aussagen 2,4 und 5 sind richtig
- C Nur die Aussagen 1,2,3 und 4 sind richtig
- D Nur die Aussagen 2,3,4 und 5 sind richtig
- E Alle Aussagen sind richtig

<http://www.Papadopoulos-Schmitt.de>

### 3 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Begriffe sind typisch für die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Gute Schulnoten
- B Beginn ab dem 9. Lebensjahr
- C Regelverletzungen
- D Großer Freundeskreis
- E Niedrige Frustrationstoleranz

### 4 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Typisch für eine organische Halluzinose ist:

- A Im Vordergrund steht eine getrübe Bewusstseinslage
- B Die Halluzinationen können von Patient manchmal als solche erkannt werden
- C Sie ist mit Verhaltenstherapie gut therapierbar
- D Sie tritt bevorzugt zur Beginn der Pubertät auf
- E Wahn dominiert das klinische Bild

### 5 Einfachauswahl

Sie sehen sich einem Patienten gegenüber, der Ihrer Meinung nach ernsthaft ankündigt, sich das Leben zu nehmen.

Unter welchen Voraussetzungen müssen Sie auch gegen seinen Willen die Unterbringung in einem Psychiatrischen Krankenhaus einleiten?

- A In keinem Fall, auch ein Selbsttötungskandidat sollte nicht gegen seinen Willen stationär untergebracht werden
- B In jedem Fall, wenn Sie von der Ernsthaftigkeit der Ankündigung und einer unmittelbar drohenden Gefährdung überzeugt sind
- C In keinem Fall, da die Einschränkung des Rechts auf frei Entfaltung der Persönlichkeit entgegensteht
- D In keinem Fall, da bei ausreichend intensiver Zuwendung eine stationäre Einweisung vermeidbar ist
- E In keinem Fall, da es sich nicht um eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung handelt.

<http://www.Papadopoulos-Schmitt.de> *Heilpraktikerschule Papadopoulos-Schmitt*

### 6 Aussagekombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Ursachen für eine Demenz können sein :

- 1 HIV-Infektion
- 2 Fehlernährung (Nikotinsäuremangel)
- 3 Schilddrüsenunterfunktion
- 4 Wiederholte Schlaganfälle
- 5 Kurzfristiger Alkoholenuss unter 15g Alkohol/Tag bei einem gesunden Erwachsenen

- A Nur die Aussagen 1,2 und 3 sind richtig
- B Nur die Aussagen 1,3 und 5 sind richtig
- C Nur die Aussagen 1,2,3 und 4 sind richtig
- D Nur die Aussagen 1,2,4 und 5 sind richtig
- E Nur die Aussagen 2,3,4 und 5 sind richtig

### 7 Einfachauswahl

Sie werden zu einem Hausbesuch zu einer Patientin gebeten und erfahren, dass sie an einer Depression leidet, die von Arzt medikamentös behandelt wird.

Seit 5 Tagen nimmt sie schon die (trizyklischen) Antidepressiva ein, und es zeigt sich keinerlei Besserung der Stimmung. (Eine Suizidgefährdung ist nicht gegeben).

Wie ist ihr weiteres Vorgehen?

- A Da sich nach 5 Tagen noch keinerlei Besserung zeigt, setzen Sie das Medikament ab und raten einen Psychiater aufzusuchen.
- B Sie setzen das bisher verordnete Medikament ab u. Verordnen Johanniskraut.
- C Da sich bisher keinerlei Besserung eingestellt hat, schlagen sie vor, die Dosis des verschriebenen Medikaments zu erhöhen.
- D Nachdem Sie sich überzeugt haben, dass die Patientin gut betreut wird, raten sie ihr weiter abzuwarten, da die Medikamente meist längere Zeit brauchen, bis sich eine Wirkung einstellt.
- E Da das Medikament keine Wirkung zeigt, muss die Ursache der Depression herausgefunden werden, am besten durch eine analytische Vorgehensweise.

### **8 Aussagekombination**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Zu den diagnostischen Leitlinien der Alkoholabhängigkeit nach ICD-10 zählen:

- 1 Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums.
- 2 Dauerhafte Organschäden, beispielsweise der Leber
- 3 Ein körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums.
- 4 Nachweis einer Toleranz
- 5 Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums

- A Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- B Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- C Nur die Aussagen 1,2 und 3 sind richtig
- D Nur die Aussagen 1,3,4 und 5 sind richtig
- E Alle Aussagen sind richtig

### **9 Aussagekombination**

Welche der folgenden Aussagen passen zur Manie?

- 1 Der Betroffene überschätzt sich selbst
- 2 Es bestehen hypochondrische Züge
- 3 Es kommt zur Assoziationslockerungen
- 4 Es besteht ein erhöhtes Schlafbedürfnis
- 5 Es kommt zur Minderwertigkeitsgefühlen

- A Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- B Nur die Aussagen 1,3 und 4 sind richtig
- C Nur die Aussagen 2,4 und 5 sind richtig
- D Nur die Aussagen 1,3,4 und 5 sind richtig
- E Alle Aussagen sind richtig

<http://www.Papadopoulos-Schmitt.de>

### **10 Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

An chronischen Opiatkonsum (Drogenkonsument) ist zu denken bei:

- A Enge Pupillen
- B Weite Pupillen
- C Schlechte Zähne
- D Deutliche Gewichtszunahme
- E Diarrhö

### 11 Einfachauswahl

Sie machen einen hausbesuch bei einem Patienten, der ständig nestelnde Bewegungen mit den Händen ausführt. Er ist scheinbar orientierungslos, redet ohne erkennbaren Zusammenhang und hat scheinbar optische Halluzinationen.

Welche der genannten Erkrankungen kommt am ehesten in Betracht?

- A Manische Phase
- B Demenz
- C Delirium tremens
- D SHT (Schädel-Hirn-Trauma)
- E Schizophrenie

### 12 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Korsakow-Syndrom treffen zu?

- 1 Typisch hierfür sind Desorientiertheit und Konfabulieren
- 2 Primäre Ursache ist ein Mangel an Vitamin C
- 3 Störungen des Zeitgefühls und des Zeitgitters treten nicht aufmerksamkeitsdefizit
- 4 Irreversible Verläufe werden beobachtet
- 5 Persönlichkeitsveränderungen treten auf

- A Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- B Nur die Aussagen 1,2 und 4 sind richtig
- C Nur die Aussagen 1,4 und 5 sind richtig
- D Nur die Aussagen 1,2,4 und 5 sind richtig
- E Alle Aussagen sind richtig

<http://www.Papadopoulos-Schmitt.de>

### 13 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu primären Enuresis treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Nach bereits erworbener Blasenkontrolle über 6 Monate tritt wieder Einnässen auf.
- B Familiäre Häufung wird nur selten beobachtet
- C Primäre Enuresis ist definiert als unwillkürliches Einnässen ohne somatischen Befund über das 5. Lebensjahr hinaus
- D Der Verlauf zeigt eine hohe Spontanheilungsrate
- E Am häufigsten tritt sie tagsüber auf (Enuresis diurna)

#### 14 Aussagenkombination

Welche der im folgenden genannten Begriffe kommen als Differenzialdiagnose zu Tic-Störungen in Frage?

- 1 Spätdyskinesien nach Neuroleptika Behandlungsverfahren
- 2 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- 3 Zwangsstörungen
- 4 Hyperkinesen durch Medikamente
- 5 Folge bestimmter Infektionskrankheiten

- A Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig  
B Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig  
C Nur die Aussagen 1,3 und 5 sind richtig  
D Nur die Aussagen 3,4 und 5 sind richtig  
E Alle Aussagen sind richtig

#### 15 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

In der klientenzentrierten Psychotherapie (nach Rogers)

- A wird die Technik des freien Assoziation angewendet  
B können Anpassungsstörungen bearbeitet werden  
C wiederholt der Therapeut die Aussagen des Patienten  
D berät de Therapeut den Patienten in Lebenskrisen  
E muss der Patient so lange in der Angstsituation verbleiben, bis die Angst abnimmt.

<http://www.Papadopoulos-Schmitt.de>

#### 16 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Störungen des Denkens gelten als Ich-Störungen?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Gedankenentzug  
B Stimmungslabilität  
C Gesteigertes Selbstwertgefühl  
D Gedankeneingebung  
E Innere Unruhe

#### 17 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Als Übertragung (im engeren Sinne) bezeichnet man in der Psychoanalyse:

- A Den Vorgang, durch den ein psychisches in ein körperliches Symptom umgewandelt wird  
B Einen psychodynamischen Vorgang, durch den ein Angstimpuls in psychotisches Erlebnis übertragen wird  
C Den Vorgang, durch den ein – z.B. optisch wahrgenommenes - Geschehen in die subjektive, für andere unverständliche Logik eines psychotischen Erlebens übertragen wird.

- D Den Vorgang des Übergehens depressiver Erlebnisweisen in manisches Erleben.
- E Frühere Beziehungs- und Interaktionsmuster werden auf die therapeutische Beziehung übertragen.

### **18 Aussagekombination**

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) für die bipolare affektive Störung nach ICD-10 (manisch-depressive Krankheit) zu?

- 1 Bei der Entwicklung affektiver Störungen können frühere Umwelteinflüsse eine Rolle spielen.
- 2 Charakteristisch bei der bipolaren affektiven Erkrankung ist eine weitgehende bis vollständige Besserung zwischen den Episoden.
- 3 Von der Erkrankung sind fast nur Männer betroffen.
- 4 Manische Episoden beginnen in der Regel abrupt (rasch, innerhalb wenige Tage) und dauern zwischen zwei Wochen und vier bis fünf Monaten.
- 5 Depressive Phasen der bipolaren Störung tendieren zu längerer Dauer, selten allerdings länger als ein Jahr.

- A Nur die Aussage 1 ist richtig
- B Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
- C Nur die Aussagen 2,3 und 4 sind richtig
- D Nur die Aussagen 1,2,4 und 5 sind richtig
- E Alle Aussagen sind richtig

<http://www.Papadopoulos-Schmitt.de>

### **19 Einfachauswahl**

Eine anankastische (zwanghafte) Persönlichkeit (nach ICD-10) ist unter anderem durch folgende Begriffe definiert:

- A Deutliche und andauernde Verantwortungslosigkeit und Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen
- B Übermäßige Inanspruchnahme durch Phantasie und Introspektion
- C Ausgeprägte Sorge, in sozialen Situationen kritisiert oder abgelehnt zu werden
- D Rigidität und Eigensinn
- E Dramatisierung bezüglich der eigenen Person, theatralisches Verhalten, übertriebener Ausdruck von Gefühlen

### 20 Aussagekombination

Welche der folgenden Aussagen zur Depression treffen zu?

- 1 Depressive Störungen können in jedem Lebensalter – auch in der Kindheit – auftreten.
- 2 Die Lichttherapie wird bei der sog. Winterdepression als Behandlungsform eingesetzt
- 3 Typische Symptome sind Verminderung des Antriebs u. Aktivitätseinschränkung
- 4 Wahnideen wie z.B. Versündigungs- oder Verarmungsideen schließen eine schwere depressive Störung aus .
- 5 In der depressiven Phase kann es zu Störungen des Vegetativums kommen (z.B. der Libido).

- A Nur die Aussagen 1,2 und 3 sind richtig  
B Nur die Aussagen 1,3 und 5 sind richtig  
C Nur die Aussagen 2,4 und 5 sind richtig  
D Nur die Aussagen 1,2,3 und 5 sind richtig  
E Alle Aussagen sind richtig

### 21 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Suizid trifft (treffen) zu?

- 1 Der Betroffene sollte nicht auf einen geplanten Suizid angesprochen werden.
- 2 In Deutschland liegt der Suizid an Rang 2 der Todesursachen
- 3 Zu den Risikogruppen zählen alleinlebende Patienten ohne enge familiäre Bindung.
- 4 Wer einmal einen Suizidversuch unternommen hat wird dies nie wieder tun.
- 5 Lehnt ein Suizidgefährdeter eine Behandlung ab, so muss dies akzeptiert werden.

- A Nur die Aussage 3 ist richtig  
B Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig  
C Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig  
D Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig  
E Alle Aussagen sind richtig

### 22 Aussagekombination

Bei welche der folgenden Medikamentengruppe ist bei regelmäßiger Einnahme mit einer Abhängigkeitsentwicklung zu rechnen?

- 1 Bei Morphinpräparaten
- 2 Bei Antidepressiva
- 3 Bei Codeinpräparaten
- 4 Bei Tranquilizern
- 5 Bei Neuroleptika

- A Nur die Aussagen 1,2 und 4 sind richtig  
B Nur die Aussagen 1,3 und 4 sind richtig  
C Nur die Aussagen 1,3 und 5 sind richtig  
D Nur die Aussagen 3,4 und 5 sind richtig  
E Alle Aussagen sind richtig

### 23 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Die Panikstörung, auch als „episodisch paroxysmale Angst bezeichnet“,

A ist gekennzeichnet durch wiederkehrende schwere Angstattacken, die vorhersagbar sind, da sie im Zusammenhang mit spezifischen Auslösern auftreten, z.B. beim Betreten eines Aufzuges.

B äußert sich oft mit plötzlich auftretendem Herzklopfen, Brustschmerz, Erstickungsgefühlen, Schwindel und Entfremdungsgefühlen (Depersonalisation oder Derealisation)

C lässt sich medikamentös problemlos beseitigen

D lässt sich durch das Auftreten optischer Halluzinationen diagnostizieren

E ist Ursache einer paranoiden Schizophrenie

### 24 Einfachauswahl

Welche der genannten Krankheiten kann Ursache eines endokrinen (hormonell bedingten) Psychosyndroms sein?

A Gehirnerschütterung

B Alkoholmißbrauch

C Hypothyreose

D Alzheimer-Erkrankung

E Drogensucht

### 25 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Typisch für die hebephrene Schizophrenie ist:

A Im Vordergrund stehen akustische Halluzinationen (Stimmenhören)

B Im Vordergrund stehen affektive Veränderungen

C Im Vordergrund steht vor allem eine allgemeine Antriebssteigerung

D Sie tritt vor allem im höheren Lebensalter auf (typischerweise nach dem 60. Lebensjahr)

E Denkstörungen treten sehr selten auf

### 26 Aussagenkombination

Zu den formalen Denkstörungen gehören:

1 perseveration bei hirnganischen Erkrankungen

2 Denkhemmung bei depressiven Zuständen

3 Ideenflucht bei manischen Erkrankungen

4 Wahnhaftes denken bei paranoiden Psychosen

5 Zerfahrenes Denken bei Schizophrenie

A Nur die Aussagen 1,3 und 4 sind richtig

B Nur die Aussagen 1,2,3 und 5 sind richtig

C Nur die Aussagen 1,2,4 und 5 sind richtig

D Nur die Aussagen 2,3,4 und 5 sind richtig

E Alle Aussagen sind richtig



### 27 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur geistigen Behinderung treffen zu?

- 1 Menschen mit geistiger Behinderung haben oft eine Mehrfachbehinderung
- 2 Von einer mittelgradigen Intelligenzminderung (Imbezilität) spricht man bei einem IQ von 85.
- 3 Bei Kindern mit geistiger Behinderung gelingt es heute in über 90% der Fälle die Ursachen zu klären
- 4 Je schwerer der Grad der geistigen Behinderung, desto häufiger bestehen psychische Störungen und Symptome.
- 5 Zu den präventiven Maßnahmen gegen bestimmte angeborene Intelligenzminderungen gehören Schutzimpfungen der Mutter vor Eintritt der Schwangerschaft

- A Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig  
B Nur die Aussagen 1,4 und 5 sind richtig  
C Nur die Aussagen 2,3 und 5 sind richtig  
D Nur die Aussagen 2,4 und 5 sind richtig  
E Alle Aussagen sind richtig

<http://www.Papadopoulos-Schmitt.de>

### 28 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Demenz treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A Bei der Demenz von Alzheimer Typ fällt einer akuter Beginn eines amnestischen Syndroms auf.  
B Die vaskuläre Demenz ist häufig mit einem Bluthochdruck verbunden  
C Im Rahmen einer AIDS-Erkrankung kann im späteren Verlauf eine Demenz beobachtet werden  
D Die Alzheimer-Krankheit ist mit Medikamenten heilbar.  
E Bei der Diagnose von Demenzerkrankungen spielen bildgebende Verfahren (z.B. kraniale Computertomographie) keine Rolle.

Heilpraktikerschule K. Papadopoulos – Schmitt Hoffeldstr. 12 63820 Elsenfeld

Heilpraktikerüberprüfung (beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie) –  
19. MÄRZ 2008

Lösungen der schriftlichen Überprüfung, GRUPPE B

1. E
2. E
3. C E
4. B
5. B
6. C
7. D
8. D
9. A
10. A C
11. C
12. C
13. C D
14. E
15. B C
16. A D
17. E
18. D
19. D
20. D
21. A
22. B
23. B
24. C
25. B
26. B
27. B
28. B C